


# PRÉVENTION DES MAMMITES AU TARISSEMENT : MARQUEZ L'ESSAI AVEC ORBESeal



**LES BONNES PRATIQUES  
AU TARISSEMENT**

**zoetis**

## Indications d'OrbeSeal :

Chez les vaches laitières :  
Prévention des nouvelles infections intramammaires pendant toute la durée du tarissement.

Chez les vaches considérées comme étant très probablement exemptes de mammites subcliniques, le médicament sera utilisé dans le cadre d'un plan de contrôle des mammites et de gestion du troupeau au tarissement.

En pratique, les critères de sélection des vaches à traiter devront s'appuyer sur les conseils du vétérinaire. Ces critères peuvent être basés sur l'historique des mammites et des numérations cellulaires individuelles des vaches, sur les résultats de tests classiquement utilisés pour la détection des mammites subcliniques ou des prélèvements bactériologiques.

## COMMENT UTILISER ORBESEAL ?

Au tarissement, des **bonnes pratiques** doivent être appliquées pour éviter les infections mammaires. En permanence, le matériel utilisé pour tarir les vaches doit être stocké à l'écart ou protégé d'une éventuelle contamination (poussière, urine, matières fécales). Le port de gants est recommandé durant toute la procédure d'administration d'OrbeSeal.



OrbeSeal doit être stocké dans une pièce à température comprise **entre 15 et 30°C**. Par grand froid, si OrbeSeal devient difficile à administrer, le mettre à réchauffer dans une pièce chauffée. **Les seringues ne doivent jamais être mises dans l'eau**. En revanche, pour les réchauffer, il est possible de plonger le seau d'OrbeSeal dans une grande baignoire contenant de l'eau chaude, tout en veillant à ne pas recouvrir le couvercle du seau.

### 1 CHASSER EFFICACEMENT L'AIR DES TUBES



1/ Tenir normalement l'injecteur d'une main.

2/ Avec le pouce et l'index de l'autre main, presser le corps de l'injecteur à la hauteur du piston.



3/ Pousser le piston tout en maintenant le corps de l'injecteur pressé (de l'air s'échappe au niveau du piston).


• **Avant cette opération**, la pâte est répartie de manière hétérogène dans le corps de la seringue.




• **Après cette opération**, la pâte est tassée entre le piston et le bout de la seringue, prête à être administrée.



## 2 ADMINISTRER ORBESAL\*



Désinfecter l'extrémité du trayon propre et sec avec un tampon imbibé d'alcool (ou des serviettes pré-imprégnées d'antiseptique). Recommencer l'opération jusqu'à ce que le tampon soit propre.



Désinfecter les 4 trayons en respectant l'ordre indiqué par la numérotation. Commencer par les plus éloignés, pour éviter de contaminer accidentellement ceux ayant déjà été désinfectés.



Insérer l'embout de la seringue dans le canal du trayon, pincer la base du trayon avec 2 doigts et administrer doucement tout le contenu. Utiliser une seringue par quartier. Ne pas masser.

OrbeSeal doit rester dans le canal du trayon pour être efficace. Administrer OrbeSeal dans les 4 trayons en commençant par les plus proches, pour minimiser la contamination des trayons n'ayant pas encore été obstrués.



Après avoir administré OrbeSeal, marquer la vache pour l'identifier. Puis tremper chaque trayon avec une solution de post-trempage.

\* En cas de mammites subclinique, OrbeSeal est à administrer après le traitement antibiotique hors lactation prescrit par votre vétérinaire.

## 3 RETIRER ORBESAL



Pour enlever OrbeSeal de l'ensemble du quartier, saisir le haut du trayon, à la jointure avec la mamelle et descendre la main tout le long du trayon en gardant les doigts serrés. Ne pas saisir le trayon au milieu car cela ne videra que la moitié inférieure.

Vider 10 à 12 fois le quartier pendant les 4 premiers jours après vêlage. Ceci garantit le retrait du bouchon et de toutes les particules d'OrbeSeal. Ne pas enlever OrbeSeal par action seule de la machine à traire.



La réussite du tarissement passe par la maîtrise d'un certain nombre d'indicateurs et **une administration correcte des médicaments de tarissement.**

**OrbeSeal réduit de 30% le risque de développer une mammite clinique dans les 100 premiers jours après le vêlage** lorsqu'il est associé à un antibiotique intramammaire hors lactation<sup>1</sup>.

Par conséquent, OrbeSeal agit sur :

- **Le taux d'incidence des nouvelles infections pendant la période sèche.**
- **Le taux d'incidence des mammites cliniques péri-partum.**

Étude réalisée avec OrbeSeal sur 890 vaches entre juillet 2007 et avril 2008 dans le sud ouest de l'Angleterre.

**ORBESEAL AMÉLIORE L'EFFICACITÉ DE LA STRATÉGIE DE TARISSEMENT VS UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE INTRAMAMMAIRE HORS LACTATION SEUL, EN RÉDUISANT LES TAUX D'INCIDENCE DES NOUVELLES INFECTIONS PENDANT LA PÉRIODE SÈCHE ET DES MAMMITES CLINIQUES PÉRI-PARTUM.**



Boîtes de 24 et 60 applicateurs



Seau de 120 applicateurs

<sup>1</sup> Bradley A.J., Breen J.E., Payne B., Williams P. et al. The use of a cephalonium containing dry cow therapy and an internal teat sealant, both alone and in combination. J. Dairy Sci. 2010;93:1566-1577.

**ORBESEAL, Suspension Intramammaire pour Bovins (vaches laitières) - Indications :** Chez les bovins (vaches laitières), prévention des nouvelles infections intramammaires pendant toute la durée du tarissement. Chez les vaches considérées comme étant très probablement exemptes de mammites subcliniques, OrbeSeal sera utilisé dans le cadre d'un plan de contrôle de mammites et de gestion du troupeau au tarissement. En pratique, les critères de sélection des vaches à traiter devront s'appuyer sur les conseils du vétérinaire. Ces critères peuvent être basés sur l'historique des mammites et des numérations cellulaires individuelles des vaches, sur les résultats de tests classiquement utilisés pour la détection des mammites subcliniques ou des prélèvements bactériologiques. **Contre-indications :** Ne pas utiliser chez les vaches en lactation. Ne pas utiliser le produit seul chez les vaches présentant une mammite subclinique au tarissement. Ne pas utiliser chez les vaches présentant une mammite clinique au tarissement. Temps d'attente : Viande et abats : 0 jour. Lait : 0 jour. **Précautions à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire :** Se laver les mains après utilisation du produit. Zoetis Assistance 0810 734 937. **Numéro d'autorisation :** AP 2017/30

Ce produit est un médicament vétérinaire. Pour une information complète, consultez la notice.  
En cas de doute ou de question, demandez conseil à votre vétérinaire.  
Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un vétérinaire.

Pour en savoir plus, venez nous rejoindre sur notre site [www.zoetis.fr](http://www.zoetis.fr)

**zoetis**